

# Indlæggelse til KAG/PCI procedure efter ambulant forundersøgelse

## Patientinformation

Du møder i 3142 og melder din ankomst ved modtagersranken. Det forventes at du bliver udskrevet samme dag. Du må ikke være alene, og skal derfor efter udskrivelsen sørge for at være sammen med voksen person eller ophold på patienthotel til dagen efter. Det kan dog forekomme, at der bliver bestilt supplerende undersøgelser, som fordrer at du forbliver indlagt, og det er derfor en god ide at forberede sig på det.

### Har du nedsat nyrefunktion og sukkersyge:

Hvis du har påvirket nyrefunktion og samtidig tager tablet Orabet, Glucophage eller Metformin mod sukkersyge, skal du pausere med disse præparater 2 dage før KAG/PCI proceduren. Du har ved ambulant forundersøgelse fået besked på, om du aktuelt har påvirket nyrefunktion.

Anvender du hjemme blodsukkerapparat til kontrol af blodsukker, bedes du medbringe dette.

### Medicin du skal holde pause med:

Hvis du tager tablet Marevan skal du holde pause 3 dage før din indlæggelse. Tager du tablet Marcoumar skal du holde pause 5 dage før indlæggelsen. Tager du et af følgende præparater Pradaxa, Xarelto, Dabigatran, Rivaroxa-ban, Eliquis, Apixaban, Edoxaban eller Lixiana skal du holde pause 1 dag før din indlæggelse.

### Medicin du skal tage:

Har du fået Plavix/Clopidogrel (i alt 8 tbl.) udleveret ved ambulant forundersøgelse, skal du tage dem aftenen før din indlæggelse

### Til indlæggelsen bedes du medbringe:

- Din sædvanlige medicin og evt. eget blodskuckerapparat
- Morgenkåbe og joggingbuks eller lign
- Toiletsager/sutsko
- Evt. høretelefoner til brug af radio og TV på sengestuen

### Bemærk venligst:

Brug af mobiltelefon er ikke tilladt på Hjertemedicinsk område, men du vil få adgang til egen gratis telefon under indlæggelsen. Rigshospitalet er Røgfrit område.

Med venlig hilsen

Hjertececentret  
Medicinsk klinik B  
Daghospital Afdeling 3142/2144  
Tlf: 35453142

